

Les oiseaux du Lac Nokoué

Un guide pour
découvrir les espèces
aviaires courantes du
site Ramsar 1018




Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux

Les zones importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d'intérêts majeurs qui hébergent une diversité d'espèces aviaires d'importance communautaire. Dans ces zones toutes les mesures nécessaires pour préserver et maintenir la diversité de toutes les espèces d'oiseaux sauvages doivent être prises.

Le Lac Nokoué représente l'une de ces ZICO. Il est notamment le lieu de passage d'espèces migratoires importantes. Parmi elles on note le dendrocygne veuf ou encore l'Astrild du Niger. D'autres espèces sont présentes toute l'année telle que le Cormoran Africain ou le héron cendré. Ce guide permet d'identifier les espèces les plus communes autour du lac, dans la zone de Sô-Ava et des Aguégués (cf carte).

Carte du Lac Nokoué – map –



Commune de Sô-Ava



Commune des Aguégués

Important Bird Areas

Important Bird Areas (IBA) host a diversity of bird species of community interest. Every necessary measures to preserve and maintain the diversity of wild birds species need to be taken.

Nokoué Lake represents one of these Important Bird Areas. It is also the meeting point of different migratory birds such as the White-faced whistling duck or also the Anambra Waxbill. Other species are present through the year among which the different Egret (Great, Intermediate or little, the Reed Cormorant and also the Grey Heron. This guide allows you to identify the main common species of the area.

Pour protéger le bon déroulement du cycle de vie des oiseaux, veillez à ne pas :


In order to protect the cycle of life of birds, it is prohibited to :

- Détenir, capturer ou abattre toutes espèces d'oiseaux ainsi que leurs œufs,
- Acheter, vendre ou exploiter l'ensemble ou une partie des espèces d'oiseaux,
- Gêner la période de reproduction ou de migration des espèces d'oiseaux,
- Couper, détruire la mangrove.

- *To hold, to catch or to kill any species of birds and their eggs*
- *Buy, sell or trade the whole or a part of bird species*
- *Disturb and obstruct the reproduction cycle or the natural migration of birds*
- *Cut and destroy mangroves*


Martin Chasseur du Sénégal

Halcyon Senegalensis



Tête et manteau gris. Plumage bleu azure avec un trait noir sur le haut des ailes.

S **A** Janvier à Juin



Héron pourpré

Ardea purpurea

Ventre brun rougeâtre et noir. Plumage ardoisée et teinté de violet-marron sur les épaules.

S **A** Toute l'année

Astrild du Niger

Estrilda poliopareia

Bec et croupe rouge. Marron pâle sur le dos et rouge délavé sur les flancs.



Héron cendré

Ardea Cinerea

Héron gris et blanc. Tête blanche et ailes grises et noires. Bec orange.



S Janvier à Juin

S **A** Toute l'année

Martin pêcheur pie

Ceryle rudis



Plumage unique noir et blanc. Le mâle a deux bandes noires sur le torse. La femelle une bande incomplète.

S **A** Toute l'année

Héron noir – Aigrette Ardoisée

Egretta ardesiaca



Héron entièrement noir avec de longues plumes. Pattes oranges foncés ou jaunes.

S **A** Toute l'année Janvier à Juin

Vanneau Épéronné

Valenus Spinosus



Haut de la tête noire, côté du cou blanc. Bandes blanches en vol qui séparent le manteau marron et les ailes noires.

S Toute l'année

A Janvier à Juin

Aigrette garzette

Egretta garzetta

De taille moyenne, se distingue de l'aigrette intermédiaire par son bec droit et noir, ses pattes noires et jaunes au bout.



Aigrette intermédiaire
Ardea intermedia

Aigrette de taille moyenne, toute blanche avec un bec jaune. Son cou est bien moins grand que la grande aigrette.

S **A** Toute l'année



S **A** Toute l'année



Râle noir à bec jaune

Amaurornis flavirostra

Marouette tout noir avec un bec jaune et des pattes rouges. L'orbite de ses yeux est également rouge.

Grande Aigrette

Ardea Alba

Grande, élancée et au long cou qui prend la forme d'un S au repos. C'est la plus large des aigrettes.



S **A** Toute l'année



Cormoran Africain

Microcarbo africanus

Cormoran de petite taille : petit bec, petit cou mais grande queue. Couleur noirâtre avec la face jaune.

A Toute l'année

S **A** Toute l'année

L'échasse blanche

Himantopus himantopus



Échassier au long cou et au bec noir et fin comme une aiguille. Il a des pattes roses très longues qui dépassent sa queue lorsqu'il vole.

Janvier
à Juin

S

A

Jacana africain

Actophilornis africanus

Manteau supérieur marron avec de longues pattes grises. Face et bec bleu, collier et tête noire avec poitrine blanche bordé d'un jaune dorée.



Petit échassier au manteau sombre. Sa queue est sombre au centre et blanche sur les côtés. Son ventre est blanc.

S

Janvier
à Juin

S

Toute
l'année

A

Manteau violet bleu sur le dessus, orange et brun rougeâtre sur le ventre. Son cou et son bec sont rouges. Il a parfois une petite crête noire.



Martin pêcheur huppé

Corythornis cristatus

Toute l'année

S

A

Guêpier à gorge blanche

Merops albicollis

Guêpier à la robe verte pale et à la tête aux motifs blancs et noirs. Couronne noire unique en son genre.

Crabier chevelu

Ardeola Ralloides

Janvier
à Juin

A



Petit héron couleur cannelle ou marron clair au repos, il montre de grandes ailes blanches lors de son vol.

A

Janvier
à Juin



Héron bicolore

Nycticorax nycticorax



Héron au manteau et à la tête noire. Ses ailes et sa queue sont grises, sa partie inférieure est blanche avec de courtes pattes jaunes.



Héron strié

Butorides striata

Janvier à Juin **S**

Milan noir

Milvus migrans

S **A**

Toute l'année

Tête grise pâle avec des traits noirs et un bec noir. Ses ailes, dans les tons marrons sont traversées d'une bande de couleur plus claire.



Petit héron trapu de couleur sombre et grise sur toute la partie supérieure. Gorge blanche qui forme une ligne jusqu'à son ventre.

A Toute l'année



Bec ouvert africain

Anastomus lamelligerus

S **A** Janvier à Juin

Cigogne toute noire avec un bec distinctif blanc-cassé et une grande mâchoire. Ses plumes peuvent avoir des reflets verts, bronzes et violets.

Dendrocygne veuf

Dendrocygna viduata



Canard au visage et à la gorge blanche avec l'arrière de la tête noire. Manteau noisette foncé et flancs noirs et blancs. Se tient droit.



Gravelot de Forbes

Charadrius forbesi

S Janvier à Juin

Pluvier à longue queue avec deux bandes noires sur la poitrine et un contour des yeux rouge. Une bande blanche part de ses yeux à sa nuque. **S** Toute l'année

BEES – Benin Environment & Education Society

Working for people and the environment

Bees agit pour la protection de l'environnement en promouvant la gestion durable des ressources naturelles notamment dans la zone humide Ramsar 1018 autour du Lac Nokoué et Ramsar 1017. A travers de nombreuses activités BEES sensibilise, reboise et développe des circuits écotouristiques dans le but de parvenir à ses objectifs de voir un monde plus vert.

Bees works for the protection of the environment through the promotion of sustainable management of natural resources. Its actions focus in wetlands especially in the two sites Ramsar 1017 and 1018. Thanks to a diversity of actions BEES raises awareness on climate change, participates to tree plantations and develops ecotourism in order to reach its goals to see a greener world.

Nous contacter


bees@hotmail.fr
+229 97 167 835

www.bees-ong.org
www.lac-nokoue.org



Woodland Kingfisher

Halcyon Senegalensis



Grey head and mantle. Upperparts bright azure-blue with contrasting black upperwing-coverts

S **A** January to June



Purple Heron

Ardea purpurea

Rufous striped with black sides and underparts.

Upperparts dark slate-grey tinged purple-chestnut on shoulders.

S **A** All year

Anambra Waxbill

Estrilda poliopareia

Thick red bill and red rump. Pale-buffish brown above and washed reddish on flanks.



Grey Heron

Ardea Cinerea

Grey-and-white heron. Head largely white, black flight feathers and underwing dark grey. Orange or yellow bill.

S **A** All year



Pied Kingfisher

Ceryle rudis



Unmistakable black-and-white aquatic kingfisher. Males have double breast-band and females a single incomplete one.

S **A** All year

Black Heron

Egretta ardesiaca



All black heron with conspicuous deep-orange or yellow feet and dark eyes. Has long and long plumes.

S **A** All year January to June

Spur-winged lapwing

Valenus spinosus



Top of head black; head sides and neck white. In flight diagonal white band contrasts with black of flight feathers and brown coverts.

S All year

A January to June

Little Egret

Egretta garzetta

Medium-sized egret distinguished from other egrets by the combination of straight black bill, black legs and demarcated yellow feet.

S **A** All year



Intermediate Egret

Ardea intermedia

Medium-sized Egret, all white with a yellow bill. Shorter and less kinked neck than Great Egret.

S **A** All year



Great Egret

Ardea alba

Large, slender Egret whose neck curved into distinctive S-shaped bulge. Largest Egret, in size similar to Grey Heron.



S **A** All year

Black Crake

Amaurornis flovirostra

All black crake with conspicuous yellow bill and red legs. Eye and orbital ring red.

A All year



Reed Cormorant

Microcarbo africanus

Small Cormorant with short bill, short neck and long tail. Blackish and short crest on forehead. Bill and bare facial skin yellow.

S **A** All year

Black-winged stilt

Himantopus himantopus



January
to June



Graceful black and white wader with long neck, black, needle-like bill and extraordinary long, pinkish legs. In flight legs extend far beyond tail



Common Sandpiper

Actitis hypoleucos

Smallish wader. White wingbar, rump and central tail dark, sides of tail white.

African Jacana

Actophilornis africanus



Bright chestnut upperparts and long greyish legs. Bill and frontal shield bright blue. Head-sides, throat and neck white bordered by golden yellow upper breast.



All year



Violet-blue above, orange-rufous below. Bill and feet coral-red. Crown feathers long and violet-blue barred black, occasionally forming a crest.

All year



January
to June



Malachite Kingfisher

Corythornis cristatus

White-throated Bee-eater

Merops albicollis

Largely pale green upperparts, long tail streamers and striking black and white head pattern. Black crown unique among bee-eaters.



January
to June



Squacco Heron

Ardeola Ralloides

January
to June



Small, stocky heron appearing largely cinnamon or buffish-brown at rest but with contrasting white wings in flight.



Black-crowned Night Heron

Nycticorax nycticorax



Mantle and top of head black. Wings and tail are grey with underparts all white with yellow legs and feet. Stout bill.



January to June



Green-backed heron

Butorides striata

Black Kite

Milvus migrans

Pale greyish head narrowly streaked black and black bill. Pale brown wings with paler diagonal bar across coverts.



Small, stocky heron with nuchal crest, dark crown and upperparts. Grey head-sides and underparts, and white throat with buff line reaching belly.



All year



All year

African openbill Stork

Anastomus lamelligerus



Blackish stork with distinctive large ivory-coloured bill with wide gap between mandibles. Feathers of neck and upperparts glossed green, bronze and purple.



January to June

White-faced Whistling Duck

Dendrocygna viduata



Mainly dark duck with long neck and legs. White face and throat contrast with black rear of head and upper neck. Breast and mantle dark chestnut.



Forbes's Plover

Charadrius forbesi

Long-tailed plover with two blackish breast-bands and red orbital ring. White band from eye across nape.



January to June



All year